n°: 13.

L'observation que Mr. Trecourt Chirurgien major de l'hopital militaire de la ville de Rocroy est interressante : il dit qu'un Cavalier estant tombé de Cheval se cassa la Cuisse a la partie moyenne du femur, elle fut reconnüe fracture oblique et reduite. quarante jours apres le malade commenca a marcher avec des bequilles sans ressentir aucune douleur, le 44.e jour de sa fracture, il fut attaqué d'une fievre maligne, sans qu'il survint a la partie qui avoit été fracturée ny gonflement, ny inflammation et le malade mourut le 14.e jour de cette fievre.

M. Trecourt fit faire l'ouverture de son Corps, et trouva un Lobe du poumon abcedé, par même occasion et sans rien, sans commencer (?) a la Cuisse, il la fit ouvrir et au premier Coup de scalpel il en sortit une odeur fœtide, continuant a

ARC 31 d. 3 n° 65
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ouvrir il remarqua que les muscles étoient fort
altere, ayant fait détacher le femur de ses
articulations, il fut surpris de la grandeur de la
fracture, dans une chute si peu considerable,
plusieurs pieces paroissoient avoir été separées
du corps de l'os, dans le tems de la fracture & reünie
dans celuy de la reduction, il remarqua
une fente considerable depuis la partie moyenne
du femur jusqu'à ses condiles & que cette fente
s'étoit écartée par le moyen d'une portion de
l'extremité superieur, qui étoit fichée dans
la cavité de l'inferieure, de sorte que cette
fente pouvoit permettre d'y introduire le
Doigt auriculaire dans toute sa longueur, et
par consequent la sortie de la moëlle qui
s'est trouvée confondüe avec la matiere
purulente qui innondoit cette partie, le
periorte s'etant trouvé entierement detruit.
Je crois que M. Tricours a prenait trop

Tost ~~de~~ au malade de se Lever, que Le Cal nétant pas
assez solide il s'y est formé un abcès, dont une
portion de la matière a passé dans le sang, a donné
ocasion a la fievre, et a tous les accidens qui l'ont
accompagnée, et enfin au depot qui s'est formé
Dans Le poumon et qui a tué Le malade.

C'est pourquoy je pense que cette observation
n'a d'utilité que pour faire connoitre les
Désordres, et les accidens qui peuvent arriver
en faisant marcher trop tost les malades
apres les fractures des Extremités inférieures.
quoy quon aye plusieurs Exemples d'accidens
presque semblables, on ne peut trop relever
L'attention des jeunes Chirurgiens, on en a
souvent vû d'autres tomber et se récasser les
membres, même audela de 60 jours, car il
y a des sujets a qui le cal se durcit tres
tard, C'est pourquoy plusieurs chirurgiens
aprés avoir levé le dernier appareil Laissent
Leur malade dans le Lit quelques jours,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Pour observer la solidité du cal, et apres leur
avoir permis de se lever une fois ou deux, ils
~~les leur~~ Examineront si la partie n'a pas changé
de figure; car il est arrivé plus d'une fois
que le cal se trouvant trop mou, le membre
~~Ces~~ s'trouve courbé a l'endroit de la fracture.

Forobe